

Dépistage du VIH

Dr Eric Billaud
Maladies Infectieuses


COREVIH des Pays de la Loire

LA « CASCADE » DES PAYS DE LA LOIRE (2011)

Nombre de patients en Pays de Loire

% de patients en Pays de Loire

% de patients en France



Rapport d'experts 2013

- **Les traitements antirétroviraux actuels sont efficaces:** ils apportent un bénéfice individuel sur la santé et diminuent ++ la transmission
- **L'épidémie VIH est mal contrôlée** en France:
7000 à 8000 nouvelles contaminations par an (2004-2007), soit un taux de 17 à 19 pour 100 000 personnes-années (chez les HSH, 1000 pour 100 000 personnes-années)
- **Enjeu :**

Dépister l'ensemble des patients pour leur proposer un traitement et mettre fin à l'épidémie

Activité de dépistage en PdL

- 200 000 sérologies soit 56/1000 (France : 80/1000)
- + : 1,6/1000 sérologies (France : 2,1/1000)
- 9% réalisées en CDAG (France : 7%)
- 194 (138 - 250) découvertes de séropositivité.

Etude ANRS - Opportunités

Opportunités manquées de dépistage et de diagnostic du VIH

Investigateur	Pr Yazdan Yazdanpanah
Co-investigateurs	Sylvie Burban, Caroline Semaille, Stéphane Le Vu
Chef de projet	Karen Champenois

Définitions

- Opportunité de dépistage : contact avec une structure de soins
- Opportunité manquée de dépistage : contact avec une structure de soins lors duquel
 - un test VIH n' est **pas** proposé au patient
 - **aucun** facteur ou symptôme évocateur d' une possible infection par le VIH
- Opportunité manquée de diagnostic : contact avec une structure de soins lors duquel
 - le dépistage du VIH n' est **pas** proposé au patient
 - malgré la **présence** d' un signe d' appel à le considérer
signe d' appel = évocation d' un facteur de risque de transmission
ou présence d' un symptôme clinique, co-infection

Etude ANRS - Opportunités Patients

- 1008 patients inclus

- Critères d'inclusion

→ Proportion plus élevée

- hommes plus âgés nés en France
- HSH (/ migrants)

	Inclus n=1008	DO 2010 n=6300	
Sexe, hommes (%)	793 79%	68%	←
Né hors de France, n (%)	267 27%	48%	←
Stade du VIH au diagnostic, n (%)			
CD4 <200/mm ³	308 31%	29%	
Sida	162 16%	15%	
Primo-infection	153 15%	11%	
Age moyen au diagnostic, ans	39,5	37,9	←
Groupe à risque			
HSH	530 53%	40%	←
Migrant d'Afrique Subsaharienne	124 12%	30%	
Hétérosexuel autres pays	342 34%	29%	
Utilisateur de drogues injectables	12 1%	1%	

Antécédents de dépistage

- 41% des patients ont eu un dépistage au cours des 3 dernières années
- 32% n'ont jamais eu de test (18% des HSH, 45% des africains du sub sahara, 44% des hétérosexuels multipartenaires)

Etude ANRS – Opportunités

Résultats

Recours aux soins


- 994 (99%) patients ont ≥ 1 recours à une structure de soins / les 3 ans avant le diagnostic de VIH

Contacts avec une structure de soins	n	%
Médecins généralistes (MG)	922	93%
Médecins spécialistes	649	65%
Hôpital	324	33%
Services d'urgences	329	33%
Autres structures de soins	377	38%

- 888 (89%) patients visitent un MG ≥ 1 fois par an

Etude ANRS – Opportunités Résultats

Opportunités manquées de dépistage / HSH asymptomatiques





Etude ANRS – Opportunités

Résultats

Proposition de test VIH à la 1^{ère} consultation selon le symptôme*

Symptômes associés au VIH *	N	Proposition de test VIH
Infections bactériennes récidivantes	87	2 (2%)
Adénopathie généralisée persistante	46	5 (11%)
Zona	35	5 (14%)
Perte de poids $\geq 10\%$ inexpliquée	45	7 (16%)
Diarrhées ≥ 1 mois	36	6 (17%)
Fièvre ≥ 1 mois	22	5 (23%)
Infections sexuellement transmissibles	101	54 (53%)

*Symptôme le plus ancien durant la période de 3 ans à 3 mois avant le diagnostic de VIH qui a amené les patients à consulter

- 
- 
- En 2012, **3 546 personnes séropositives** bénéficient d'un suivi médical sur la région.
 - 136 personnes ont découvert leur séropositivité et à un stade avancé dans 50% des cas ce qui représente une perte de chance.
 - On estime à près de 1 000 le nombre de personnes qui ignorent qu'elles sont infectées par le VIH en Pays de la Loire.

Le dépistage et le recours aux soins

Le dépistage systématique (plan VIH 2010) ne « marche » pas.

Le groupe d'experts recommande:

■ Un dépistage large mais ciblé sur

- des **situations** cliniques (Cancers, tuberculose, zona, pneumopathie, infections herpétiques récidivantes, dermite séborrhéique, asthénie chronique, syndrome pseudogrippal prolongé ou atypique, lymphopénie, thrombopénie, amaigrissement et/ou fièvre prolongée inexpliquée, etc.)
- des **circonstances** favorisantes (contraception, IVG, dépistage hépatites ou IST..) ou
- l'appartenance à des **populations** à forte prévalence ou sous diagnostiquées
 - Parmi les 28 800 qui ne connaîtraient pas leur infection par le VIH, on compterait :
 - – 9 000 HSH (31 %) [95 % IC : 7 700-10 100] ;
 - – 9 800 hétérosexuels (hommes et femmes) français (34 %) [95 % IC : 5 200-13 500] ;
 - – 9 500 hétérosexuels (hommes et femmes) nés à l'étranger (33 %) [95 % IC : 6 100-12 300] ;
 - – 500 UDI (2 %) [95 % IC : 100-800]

■ <http://www.corevih-pdl.fr/>